

ХОНДРОАСК® Плюс

Стимулятор регенерации тканей

«УТВЕРЖДЕНО»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Государственное унитарное предприятие
«Государственный центр экспертизы и
стандартизации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Присим Вас внимательно прочесть данную инструкцию до того, как Вы начнете принимать лекарство. Она содержит важную для Вас информацию. Сохраните этот листок-вкладыш с информацией по применению, так как позднее Вам может потребоваться прочитать его еще раз. Для получения любой дополнительной информации или совета, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту. Ваш врач выписал данный лекарственный препарат Вам лично. Вы не должны передавать его другим лицам. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с Вами.

Торговое название препарата: Хондроаск® Плюс

Действующие вещества (МНН): глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат.

Лекарственная форма: капсулы.

Состав:

1 капсула содержит:

активные вещества: глюкозамина гидрохлорид – 250 мг, хондроитина сульфат – 200 мг;

вспомогательные вещества: натрия крахмал гликополят, магния стеарат.

Описание: капсулы белого цвета №0. Содержимое капсул – порошок белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Другие комбинации противовоспалительных препаратов. Стимулятор трофики тканей и регенерации.

Код ATХ: M01BX.

Фармакологические свойства

Стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Глюкозамина гидрохлорид и хондроитина сульфат принимают участие в биосинтезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща и стимулируя регенерацию ткани. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса и обеспечивает неспецифическую защиту, в том числе от нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов (ГКС). Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторным и умеренным противовоспалительным действием.

Хондроитина сульфат, независимо от того, всасывается ли он в интактной форме или же в виде отдельных компонентов, служит дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса. Стимулирует образование протеогликанов и коллагена типа II, а также защищает хрящевой матрикс от ферментативного расщепления (путем подавления активности гиалуронидазы) и от повреждающего действия свободных радикалов; поддерживает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует механизмы reparации хряща и подавляет активность тен-ферментов (эластаза, гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ. При лечении остеоартроза облегчает симптомы заболевания и уменьшает потребность в НПВП.

При приеме Хондроаск® Плюс устойчивый лечебный эффект достигается в течение не менее 6 месяцев.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит глюкозаминогликанов в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты.

Фармакокинетика

При приеме внутрь 90% хондроитина сульфата всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Максимальная концентрация в плазме крови отмечается через 3-4 часа, в синовиальной жидкости – через 4-5 часов. Биодоступность по отношению к синовиальной жидкости: для хондроитина – 13%, для глюкозамина – 25% (выражен эффект «первого прохождения» через печень). При распределении в тканях наибольшие концентрации обнаруживаются в печени, почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистируют в костной и мышечной ткани. $T_{1/2}$ – 6-8 часов. Выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде, частично – с калом.

Показания к применению

Комбинация глюкозамина и хондроитина рекомендуется детям, взрослым и пожилым лицам в комплексе лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и других состояний, сопровождающихся дегенеративно-дистрофическими изменениями тканей суставного хряща.

Применяется при:

- первичном и вторичном остеоартрозе I–III степени, остеопорозе, пародонтопатиях;
- плечелопаточном периартрите;
- остеохондрозе, спондилезе, хондромаляции надколенника;
- переломах (для ускорения образования костной мозоли);
- дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника.

Информация о правильном применении

Способ применения и дозы

Всегда примите Хондроаск® Плюс точно в соответствии с рекомендацией Вашего лечащего врача. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Взрослым и детям старше 15 лет в течение трех первых недель препарат назначают по 2 капсулы 3 раза/сут; в последующие дни по 2 капсулы 2 раза/сут. Продолжительность лечения – 3-6 мес. При необходимости возможно проведение повторных курсов лечения, продолжительность которых устанавливают индивидуально. Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды.

Побочные действия

Как и любой лекарственный препарат, Хондроаск® Плюс может вызывать побочные реакции, хотя они проявляются не у каждого. В отдельных случаях возможны следующие побочные реакции:

Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко наблюдаются

диспепсия, ощущение незначительной тошноты, возможна боль в эпигастральной области, диарея, запор, метеоризм.

Со стороны иммунной системы: в редких случаях – аллергические реакции, включая гиперемию и сыпь на коже, зуд, крапивницу, ангионевротический отек.

Со стороны кожи и ее структур: выпадение волос.

Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, общая слабость, сонливость, нарушения зрения.

Все перечисленные симптомы проходят после отмены препарата.

Если у Вас отмечаются любые другие побочные реакции, не описанные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите Вашему врачу, фармацевту или производителю.

Информация, необходимая до начала применения лекарственного средства

Противопоказания

Не применяйте Хондроаск® Плюс в следующих случаях:

- повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата (аллергические реакции),
- фенилкетонурия,
- выраженные нарушения функции почек,
- детский возраст до 15 лет,
- период беременности и лактации.

Лекарственные взаимодействия

Пожалуйста, сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, даже если они отпускаются без рецепта.

При комбинированном применении усиливает всасывание из ЖКТ тетрациклинов и уменьшает всасывание пенициллинов и хлорамфеникола. Совместим с глюкокортикоидами.

Хондроаск® Плюс усиливает действия антиагрегантов, фибринолитиков, а также кумариновых антикоагулянтов (например,варфарина), что может вызывать повышение значений МНО (международного нормализованного отношения) и приводить к кровотечениям.

На фоне приема Хондроаск® Плюс снижается потребность в нестероидных противовоспалительных средствах.

Особые указания

Не превышайте дозы, рекомендованной врачом. При различных формах пародонтопатий курс лечения следует продолжать не менее 3 месяцев.

Препарат с осторожностью следует назначать больным с сахарным диабетом, с бронхиальной астмой и со склонностью к кровотечениям. В начале лечения больным с сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня сахара в крови.

Применение в период беременности и кормления грудью

Если Вы обнаружили, что беременны во время применения Хондроаск® Плюс, немедленно сообщите об этом Вашему врачу, так как только он может решить вопрос о необходимости продолжения лечения.

В связи с тем, что клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат в этот период не следует применять.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Прием препарата Хондроаск® Плюс не влияет на способность пациента выполнять работу, требующую повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Передозировка

При приеме более высокой дозы, чем Вам назначено, немедленно обратитесь за помощью к врачу!

Не описана и маловероятна. В случае передозировки рекомендуется симптоматическое лечение, промывание желудка.

Форма выпуска

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению в упаковке из картона.

По 10, 20, 30, 40, 50, 60 или 90 капсул во флаконе.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 15°С до 25°С.

Срок годности

3 года. Препарат не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

**Наименование и адрес организации, принимающей
претензии (предложений) по качеству лекарственных
средств на территории Республики Узбекистан**

ООО «NIKA PHARM», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 7-
проезд ул. Сайрам, дом 48-А.

Тел: +(99871) 1508668; Факс: +(99871) 1508448.

www.nikapharm.uz

NIKAPHARM
фармацевтическая компания

Отзывы и пожелания от потребителей по качеству лекарственной продукции и
информацию о каких-либо побочных действиях или об отсутствии
эффективности лекарственного средства просим направлять по следующему
адресу или сообщать по телефону:

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
7-проезд ул. Сайрам, дом 48-А.



+ (998 71) 150-87-04



+ (998 71) 150-87-05



info@nikapharm.uz



www.nikapharm.uz

XONDROASK[®]

Plyus

To'qimalar
regeneratsiyasini rag'batlantiruvchi

ТИБИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Мазкур қўллаш бўйича йўрикномани диккат билан ўйб чиқишини илтимос килимиз, чунки Сиз дори воситасини қабулини боштайсиз. Унда Сиз учун мухим маълумотлар мавжуд. Қўллаш бўйича маълумот тутиувчи ушбу варак-китмани сакраб кўйинг, чунки кейинчалик Сизда унча бир бор ўйб чиқиши зарурат тутиши мумкин. Илтимос, ҳар қандай қўшимча маълумот ёки маслаҳатни олиш учун ўзингизнинг шифокориниз ёки фармацевтическага муроҳат килинг. Сизнинг шифокориниз ушбу дори воситасини шахсан Сизга тайлангандан. Унда Сиз бошқа шахсларга берманг. Препарат уларга зиён етказиши мумкин, ҳатто уларнинг касаллик белгилари Сизни билан ушаш бўлса ҳам.

Препаратнинг савдо номи: Хондроаск[®] Плюс
Таъсири: этувчи моддалар (ХПН): глюкозамин гидрохлориди, хондроитин сульфати.

Дори шакли: капсулалар

Таркиби:

1 капсула кўйидагиларни саклайди:
фаол моддалар: глюкозамин гидрохлориди - 250 мг, хондроитин сульфати - 200 мг;

ёрдамчи моддалар: натрий крахмал гликополити, магний стеарати.

Таърифи: №0 ўйнами оқ ранги капсулалар. Капсула таркиби – оқ ёки бироз сарғиш тусли оқ ранги кукун.

Фармакотерапевтик гурухи: Яллиганишига қарши воситаларнинг бошқа комбинациялари. Тўқималар озиқланниши ва регенерациясини рагбатлантирувчи восита.

АТХ коди: M01BX.

Фармакологик ҳусусиятлари

Тоғай тўқимаси регенерациясини рагбатлантиради. Глюкозамин ва хондроитин сульфати бириттирувчи тўқима биосинтезида иштирок этади, тоғай тўқимасининг булишиларни олдини олади ва тўқима тикланишини рагбатлантиради. Эзоген глюкозаминнинг тўқимага киритилиши тоғай матрикси ишлаб чиқарилишини кучайтиради ва носцептифик химояни, шу жумладан ностероид яллиганишига қарши воситалар (НЯКВ) ва глюкокортикоидерондрап (ГКС)дан химояни ҳам, таъминлайди. Глюкозамин гидрохлориди хондропротекторлик ва ўрта миёна яллиганишига қарши таъсирга эга.

Хондроитин сульфат интакт ёки алоҳида унсурлар кўринишидан сўрилишидан қатъий назар соглом тоғай матриксининг пайдо бўлиши учун қўшимча субстрат бўлиб хизмат қиласди. Протеогликанлар ва коллагенларнинг II-турини ишлаб чиқарилишини рагбатлантиради, ҳамда тоғай матриксини ферментатив парчаланишидан (гипауруониздани фаоллигини босиши йўли билан) ва эркин радикалларнинг таъсирдан химоя қиласди. Синовиал суюклик ёпишқоклигини таъминлайди, тоғайнинг репарация механизмини рагбатлантиради ва тоғайнинг парчалайдиган эластаза, гиалуронидаза ферментлар фаоллигини камайтиради. Остеоартритни даволашда касаллик белгиларни енгиллаштиради ва НЯКВ га бўлган эҳтиёжин камайтиради.

Хондроаск[®] Плюс қўллаш глицинада барқарор даволовчи самарага 6 ойдан кам бўлмаган муддатда эришилади.

Глюкозамин гидрохлориди, хондропротектор хусусиятга эга, организмда глюкозаминогликанлар танкислигини камайтиради, протеогликанлар ва гиалурон кислотасининг биосинтезидан иштирок этади.

Фармакокинетикаси

Ичга қабул қилинганида хондроитин сульфатининг 90% меъда-ичак йўллари (МИЙ) дан сўрилади. Қон плазмасидаги максимал концентрацияси 3-4 соатдан сўнг, синовиал суюклика нисбатан биокиралишилиги: хондроитин учун - 13%, глюкозамин учун эса - 25% (жигар орқали «биринчи ўтиши» сармаси ифодаланган). Тўқималарда таксимланнишида энг катта концентрациялари жигарда, бўйракда ва бўғим тоғайида аникландади. Қабул қилинган дозанинг таҳминан 30% сукъя ва мушак тўқимасида айланниб юради. Т_{1/2} - 6-8 соатни ташкил киласди. Асоссан сийдик билан ўзгармаган ҳолда, қисман ахлат билан чиқарилади.

Қўлланилиши

Глюкозамин ва хондроитиннинг мажмуаси болалар, катталар ва кекса ёшли шахсларда бўғим тоғайи тўқималарининг дегенератив-дистрофик ўзгаришлари билан кечадиган таянч-харакат аппаратининг касалларлари ва бошқа ҳолатларни мажмуавий даволаш учун тавсия килинади. Уйидагиларда қўлланади:

- I-III-даражали бирламчи ва иккимали остеоартроз, остеопороз, пародонтопатиялар;
- епка-курак периартрити;
- остеохондроз, спондилёс, тизза копкоғининг хондромалицияси;
- синишишлар (сукъ қадори ҳосил бўлишини тезлаштириш учун);
- бўйимлар ва умуртқа погонасиининг дегенератив-дистрофик касалларлари.

Тўғри қўлланилиши хақида маълумот

Қўллаш усулни ва дозалари
Хондроаск[®] Плюс нигар доим сизни даволаётган шифокорингиза кўрсатмаларига амал қўлган ҳолда қўлланг. Агар сизда бирон нарсага ишончлилигидан бўлса фармацевтга ёки шифокорингиза мурожат килин.

Катталар ва 15 ёшдан ошган болаларга биринчи 3 ҳафта давомида 2 та капсуладан суткада 3 марта, кейинги кунларда эса 2 та капсуладан суткада 2 марта бўюрилади. Даволаш муддати 3-6 йони ташкил киласди. Қайта даволаш курслари ўтказилишига зарурат бўйланда уларнинг давомийлиги индивидуал белgilanади. Дори воситасини оқват қабулидан қатъий назар кўп бўлмаган мидордаги сув билан ичиш керак.

Ножӯя таъсирлари

Ҳар қандай дори воситаси каби, Хондроаск[®] Плюс ҳам ножӯя таъсир кўрсатши мумкин, гарчи улар ҳар кимда учрамаса ҳам. Базъи ҳолларда кўйидаги ножӯя реакциялар кузатилиши мумкин: Меъда-ичак йўли томонидан: кам ҳолларда диспепсия, бироз кунгил айниши хиссси, эпигастрал соҳада орғи, ич кетиши, қабзият, корининг дам бўлиши аникланиши мумкин.

Иммун тизими томонидан: жуда кам ҳолларда – аллергик реакциялар, шу жумладан, терида кизариш ва тошмаларнинг пайдо

«ТАСДИҚЛАНГАН»
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚИНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
«Дори воситалари тиббий бўюмлар ва
тиббий техника экспертизаси ва
стандартизацияси давлат маркази»
Давлат унитар корхонаси

бўлиши, терининг қичиши, эшакеми, ангионевротик шишировижланши мумкин.

Тери ва унинг ҳосилалари томонидан: сочларнинг тўкилиши кузатилиши мумкин.

Нер тизими ва сезими аъзолари томонидан: бош оғриги, умумий холисизлик, уйқучанлик, кўришининг бузилиши аникланиши мумкин. Кептирилган барча белгилар дори қабули тўхтатилгандан кейин йўқолади.

Ушбу йўрикномада кўрсатилмаган бошқа салбий реакциялар сизда кузатилса, илтимос фармацевтга ёки шифокорингизга хабар қилинг.

Дори воситасини қабул қилишдан олдин билиш лозим бўлган маълумотлар

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Хондроаск[®] Плюс ни кўйидаги ҳолларда қўлланаманг:

- препаратнинг ҳар қандай таркибий қисмига шахсий юқори сезувчаник (аллергик реакциялар),
- фенилкетонурия,
- бўйрак фаолигининг яқол бузилишлари,
- 15 ёнчага бўлган болалар,
- хомиладорлик ва эмизиш даври.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Илтимос, сизни даволовни шифокорингизга ёки фармацевтга бўшида дори воситаларни қабул қиласиганда тўғрисида хабар беринг, хатто рецептсиз бериладиган дори воситаси бўйса ҳам.

Мажмуавий қўлланганида тетрациклинерларнинг МИЙ дан сўрилишини кучайтиради, пенициллинлар ва хлорамфениколнинг сўрилишини эса сусайтиради. Глюкокортикоидлар билан бирга кўлланниши мумкин.

Хондроаск[®] Плюс антиагрегантлар, фибринолитиклар, ҳамда кумаринлар антикоагулянтлар (масалан, варфарин) нинг таъсирларини кучайтиради, бу эса ҳалқаро мөтёрлаштирилган нисбат (ХМН) кўрсаткичларининг ошишини чақириб, қон кетишиларга олиб келиши мумкин.

Хондроаск[®] Плюсни қабул қилиши фонида ностероид яллиганишига қарши воситаларга эҳтиёж камаяди.

Махсус қўрсатмалар

Шифокор томонидан тавсия этилган доза оширилмасин. Пародонтопатияларнинг турли шаклларида даволаш курсини камиди 3 ой давом этириши керак.

Қанди диабет, бронхиал астмага чалинган ва қон кетишиларга мойилини бўлган беморларда дорини этиёткорлик билан қўллаш керак. Қанди диабетга чалинган беморларда даволашнинг бошланшиши қондаги қанди миқдорини назорат қилиш мақсадга мувофиқиди.

Хомиладорлик ва лактация даврида қўллаш

Агар Хондроаск[®] Плюс билан даволаниш вақтида сизнинг хомиладорлигининг маълум бўлса, дарҳол шифокорингизга мурожат қилин, чунки факат у даволаниши давом этириши масасини ҳал киласди.

Хомиладорлик ва лактация даврида препаратнинг самарадорлиги ва хавислиги тўғрисида клиник маълумотлар йўклиги сабаби препаратни ушбу даврда қўллаш мумкин эмас.

Транспорт воситаларини ва механизmlарни бошқариши қобилиятiga таъсири

Хондроаск[®] Плюс препаратнинг қабули беморлардаги юқори диккат ва тез руҳий-ҳарқат реакцияларини талаб этувчи ишларни бажариш қобилиятига таъсир килмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Сизга бўрилган дозадан юкорироқ доза қабул қилинганида дарҳол шифокорга мурожаат қилинг!

Таърифланмаган ва эҳтиомли кам. Дозани ошириб юбориш ҳолларида симптоматик даволаш, мөтъдани ювиш тавсия қилинади.

Чиқарлиши шакли

Контур уяли ўрамда 10 тадан капсула. Бир, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ёки 12 та контур уяли ўрамлар қўллаш бўйича йўрикнома билан бирга картон кутия жойланади. Флаконда 10, 20, 30, 40, 50, 60 ёки 90 та капсулаган.

Саклаш шароити

Курик, ёргулиқдан химояланган ва болалар олопмайдиган жода, 15°Cдан 25°C гача бўлган ҳароратда саклансан.

Яроқлилик муддати

3 йил. Яроқлилик муддати таъсирни сунг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи маъниси

«NIKA PHARM» МУЖ, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Сайрам 7-тор кучаси, 48-А уй.

Тел: +(99871) 1508668; Факс: +(99871) 1508448.

www.nikapharm.uz

NIKAPHARM
Фармацевтик компания

Дори воситалари сифати ёки препаратнинг таъсир самарасизлиги тўғрисида истеъмолчиларнинг истак ва таклифларни қўйидаги манзилга юборишингизни сураймиз: