



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РИНОКСИЛ® БЭБИ

**Просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию до того, как Вы начнете принимать лекарство. Она содержит важную для Вас информацию.**

Сохраните эту инструкцию с информацией по применению, так как позднее Вам может потребоваться прочитать ее еще раз.

Для получения любой дополнительной информации или совета, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

Ваш врач выписал данный лекарственный препарат Вам лично. Вы не должны передавать его другим лицам. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с Вашими.

**Торговое название препарата:** Риноксил® Бэби

**Действующее вещество (МНН):** оксиметазолин

**Лекарственная форма:** капли назальные 0,01%

**Состав:**

100 мл раствора содержат:

**активное вещество:** оксиметазолина гидрохлорид - 0,01 г;

**вспомогательные вещества:** натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия эдетат (Трилон Б), бензалкония хлорид, пропиленгликоль, раствор соляной кислоты 0,1М или раствор гидроксида натрия 0,1М, вода очищенная.

**Описание:** прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство для лечения заболеваний ЛОР-органов. Деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения. Симпатомиметики.

**Код ATХ:** R01AA05

### **Фармакологические свойства**

Адреномиметическое средство для местного применения. Препарат оказывает сосудосуживающее и антиконгестивное действие. Стимулирует Альфа 1-адренорецепторы и суживает сосуды в местах аппликации, уменьшает отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей, облегчает носовое дыхание, снижает приток крови к венозным синусам.

### **Фармакокинетика**

При местном применении оксиметазолин в незначительной степени подвергается системной абсорбции, поэтому его концентрация в плазме крови незначительная. Действие проявляется через 15 минут. Продолжительность действия 10-12 часов. Выводится, в основном, в неизменном виде через почки и кишечник. Период полувыведения 5-8 суток.

### **Показания к применению**

Для уменьшения отека слизистой оболочки носа, носоглотки и гайморовых пазух при:

- простудных заболеваниях (острый ринит);
- воспалении носовых пазух (острый синусит);
- евстахиите;
- аллергическом рините (в т.ч. сенная лихорадка);

- среднем отите (в качестве средства вспомогательной терапии, т. к уменьшает отечность слизистой вокруг отверстия евстахиевой трубы).

Применяют также для облегчения осмотра или хирургических манипуляций в полости носа.

### **Информация о правильном применении**

#### **Способ применения и дозы**

*Всегда применяйте Риноксил® Бэби точно в соответствии с инструкцией Вашего лечащего врача. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.*

Применяют интраназально.

Риноксил® Бэби капли назальные 0,01% предназначены для применения в нос детям в возрасте до 1 года.

**Детям в возрасте до 4 недель жизни** назначают по 1 капле Риноксил® Бэби в каждый носовой ход 2 раза в сутки.

**С 5-й недели жизни и до 1 года** назначают по 1-2 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки.

Не следует применять препарат чаще 2-х раз в сутки.

Перед применением флакон следует перевернуть. Препарат следует закапывать, запрокинув голову ребенка.

Непосредственно перед применением препарата флакон нужно подержать в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Перед введением препарата необходимо тщательно прочистить нос.

Доказана эффективность также и следующей процедуры: в зависимости от возраста 1-2 капли Риноксил® Бэби наносят на вату и протирают каждую ноздрю.

В рекомендованной дозе без консультации врача препарат можно применять не более 3-5 дней. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Препарат можно применять повторно только через несколько дней.

Препарат в дозах выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

### **Побочные действия**

*Как и любой лекарственный препарат, Риноксил® Бэби может вызвать побочные реакции, хотя они проявляются не у каждого.*

Обычно Риноксил® Бэби переносится хорошо. При частом или длительном применении препарата возможны:

**Местные реакции:** часто - жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чиханье, сильное чувство заложенности носа (реактивная гиперемия), которое возникает после окончания эффекта от применения препарата Риноксил® Бэби, нарушение зрения (при попадании в глаза). Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отеку слизистой оболочки полости носа (медикаментозный ринит).

**Со стороны сердечно-сосудистой системы:** нечасто - повышение АД, тахикардия; возможно - ощущение сердцебиения.

**Со стороны нервной системы:** редко - головная боль, бессонница; возможно - головокружение, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна (у детей).

**Прочие:** возможно - тошнота, экзантема.

**Если у Вас отмечаются любые другие побочные реакции, не описанные в этой инструкции, пожалуйста, сообщите Вашему врачу, фармацевту или производителю.**

## *Информация, необходимая до начала применения лекарственного средства*

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к препарату, в том числе к другим противоотечным средствам для интраназального применения; атрофический ринит; гипертриеоз; воспаление слизистой носовых ходов без выделения секрет; беременность, лактация.

**С осторожностью:** следует применять препарат при повышенном внутриглазном давлении, хронической почечной недостаточностью, аритмии, гиперплазии предстательной железы с клиническими симптомами (задержка мочи), закрытоугольной глаукоме, выраженном атеросклерозе, феохромоцитоме, хронической сердечной недостаточности, сахарном диабете, артериальной гипертензии.

### **Лекарственные взаимодействия**

*Пожалуйста, сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, даже если они отпускаются без рецепта.*

#### *Сосудосуживающие средства.*

При одновременном назначении препарата с другими сосудосуживающими средствами (независимо от способа введения) возможно взаимное усиление побочных эффектов.

#### *Местноанестезирующие средства.*

Оксиметазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств и пролонгирует их эффект.

*Ингибиторы МАО (включая период в течение 14 дней после их отмены) и трициклические антидепрессанты.*

При одновременном назначении – повышение АД.

### **Особые указания**

Следует избегать длительного применения и передозировки.

Пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, гипертриеозом препарат назначают с осторожностью.

Обычно при применении Риноксил® Бэби в рекомендованных дозах для ликвидации симптомов ринита достаточно 3 дней. Если за этот период симптомы не исчезнут, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Использование одного флакона несколькими лицами может привести к распространению инфекции. Флаконом должно пользоваться только одно лицо (риск передачи инфекции).

#### *Применение при беременности и в период лактации*

*Если Вы обнаружили, что беременны во время применения препарата, немедленно сообщите об этом Вашему врачу, так как только он может решить вопрос о необходимости продолжения лечения.*

При применении в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозировку. Препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода или ребенка.

#### *Применение при нарушениях функции почек*

С осторожностью следует применять препарат при хронической почечной недостаточности.

#### *Применение у детей*

Применяется у детей по показаниям в соответствующих лекарственных формах.

Следует избегать длительного использования и передозировки препарата у детей.

#### *Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами*

При применении в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключить общее влияние на сердечно-сосудистую систему и ЦНС. В таких случаях возможно снижение способности к управлению транспортными средствами и другим потенциально опасным видам деятельности.

### **Передозировка**

*При приеме более высокой дозы, чем Вам назначено, немедленно обратитесь за помощью к врачу!*

После значительной передозировки или случайного приема внутрь могут отмечаться такие симптомы: миоз, тошнота, рвота, цианоз, гипертермия, тахикардия, аритмия, сосудистая недостаточность, артериальная гипертензия, дыхательные расстройства, отек легких, остановка сердца. Кроме этого могут развиваться психические расстройства, а также угнетение функций ЦНС, которые сопровождаются сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и возможным развитием комы.

**Лечение:** прекращение применения, симптоматическая терапия.

### **Форма выпуска**

Капли назальные 0,01% по 10, 15, мл во флаконах. Флакон из темного стекла, снабженный пластмассовым колпачком-пипеткой или флакон-капельница с завинчивающейся пластмассовой крышкой вместе с инструкцией по медицинскому применению помещается в картонную упаковку.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

### **Срок годности**

3 года.

Срок хранения после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель:**

**Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

ООО «NIKA PHARM»,

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 7- проезд ул.Сайрам, дом 48-А.

Тел.: +(998 78) 150 86 68; факс: +(998 78) 150 84 48.

[www.nikapharm.uz](http://www.nikapharm.uz)