

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

ДИСЕПТ® DISEPT

Мақсуд бўйича йўриқномани дори воситасини қабул қилишдан олдин диққат билан ўқиб чиқишингизни илтимос қиламиз. Унда Сиз учун муҳим маълумотлар жамғуру.

Қўллаш бўйича маълумотни тутувчи ушбу варақ-қирғитмани сақлаб қўйинг. Чунки кейинчалик Сизда уни яна бир бор ўқиб чиқишга зарурат туғилиши мумкин.

Илтимос, ҳар қандай қўшимча маълумот ёки маслаҳатни олиш учун ўзингизнинг шифокорингиз ёки фармацевтингизга мурожаат қилинг.

Сизнинг шифокорингиз ушбу дори воситасини шахсан Сизга тайинлаган. Уни Сиз бошқа шахсларга берманг. Препарат уларга зиён етказиши мумкин, ҳаттоки уларнинг касаллик белгилари Сизники билан ўхшаш бўлса ҳам.

Препаратнинг савдо номи: ДИСЕПТ®

Таъсир этувчи моддалар (ХПН): хлоргексидин ва аскорбин кислотаси

Дори шакли: шимиландиган таблеткалар

Таркиби:

фаол моддалар: хлоргексидин гидрохлориди – 5 мг, аскорбин кислотаси – 50 мг;

ёрдамчи моддалар: сорбитол, лактоза, лимон кислотаси, сукралоза, тальк, коллоидли кремний диоксиди, магний стеарат, ментол, апельсин хушбўйи.

Таърифи: оқ ёки сарғиш тусли оқ рангли, доғлари бўлган, ишлатилган ароматизаторга хос бўлган кучсиз ҳилда эга таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Антисептик восита.

АТХ коди: А01АВ03

Фармакологик хусусиятлари

Кенг спектри микробга қарши восита. Хлоргексидин бактерияларнинг хужайравий мембранасини бузиб, грамусбат ва граммаңий бактерияларга (кислотали шаронга чидамли Pseudomonas таъқчаларига, спора ва вирусларга фаол бўлмаган) бактериоцид таъсир кўрсатади. Тиш колдикларини самарали йўқ қилади.

Аскорбин кислотаси (С витамини) бор бўлиши маҳаллий иммунитетни ошириб ўтказмалардаги таъсирни шундай омишлар, масалан, тиш тошини, пародонтопатияни олдини олади; коллаген ва хужайраларора моддаларни ҳосил бўлиш жараёнида иштирок этади.

Фармакокинетика

Хлоргексидин сўлак билан бирга ичга тушиши мумкин, лекин унинг ошқозон-ичак йўлида сўрилиши аҳамиятсиз. Хлоргексидин ошқозон ҳазм қилиш трактидан тахминан 1% абсорбцияланади. Препаратни қабул қилингандан сўнг қондаги максимал концентрацияси 30 минутдан сўнг етади ва 0,206 мкг/л ташкил қилади. Хлоргексидин жигарда жуда кичик миқдордагина метаболизмга учрайди ва ичак оғзига ўт сууюклиги билан чиқарилади. Одатда ютиб юборилган хлоргексидинини 90% ўзгармаган ҳолда ахлат билан чиқиб кетади, 1%- буйрақлар орқали чиқарилади. Аскорбин кислотаси ошқозон ичак трактида яқши абсорбцияланади. Унинг оксид плазмаси билан боғланиш даражаси тахминан 25% ташкил қилади. Аскорбин кислота додигидроаскорбин ва шовул кислотасигагина метаболизмланади. Аскорбин кислотаси асосан сийдик билан чиқарилади.

Қўлланилиши

Дисепт® қўйидаги ҳолларда қўлланилади:

- оғиз бўшлиғи, томоқ, халқум инфекцияларида;
- милк касалликларинг янгилашишида;
- жаррохлик амалиёти қўлланилгандан сўнг пародонтит;
- пародонтопатияда;
- пародонтозта;
- афтозли стоматитда.

Тўғри қўллаш ҳақида маълумот

Қўллаш усули ва дозалари

Ҳар доим Дисепт®ни Сизнинг доловчи шифокорингиз тавсияларига аниқ қатъий амал қилган ҳолда қўлинг. Агар Сиз нимаданир иккилансангиз, ўзингизни шифокорингиз ёки фармацевтингиздан сўранг.

Ичга, 1 та таблеткадан суткада 3-4 маҳал, оватдан сўнг тишларни тозаллаган тўлиқ эриб кетгунча оғизда ушлаб турилади. Таблеткани секин шимши керак. Препарат қабулдан сўнг 2 соат ичида оғиш бўшлиғини чайишдан ва кўп миқдорда сууюклик қабул қилишдан сақланиш керак. Ўртача даволаш курсининг давомийлиги 5-7 кун.

Зарурати бўлганда 14 кун ичида суткада 3 та таблеткадан тайинланади.

Ноқўя таъсирлари

Ҳар қандай дори воситаси каби, Дисепт® ҳам, ҳар бир истеъмолчида кузатилмаасада, ноқўя таъсирлар қачириси мумкин.

Баъзи ҳолларда қўйидаги ноқўя таъсирлар кузатилиши мумкин: кўнгил айиниши, эпигастриядаги оғриқлар, аллергия реакциялар (терида тошмалар), таъмининг бузилиши, пародонтит, тил ва шиллик каватининг кассалликлари, пломба ва тиш протезининг рангги ўзгариши.

Агар Сизда ушбу йўриқнома-қирғитмада таърифланмаган ҳар қандай бошқа

ноқўя таъсирлар қайд этилса, илтимос, Ўзингизни шифокорингизга, фармацевтингизга ёки ишлаб чиқарувчига хабар беринг.

Дори воситасини қўллашни бошлашдан олдин зарур бўлган маълумот

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Дисепт® қўйидаги ҳолларда қўлланилмасин:

Хлоргексидин ёки бирон бир ёрдамчи моддаларга ўта сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

- лактозани қўтара олмаслик;

- 3 ёшгача бўлган болалар (ушбу дори шакли учун).

Махсус кўрсатмалар

Таблеткани оватдан сўнг қабул қилиш тавсия этилади. Таъм билиш сезириллиги ўзгариши мумкин, лекин бу препаратнинг таъсир одатда қабул қилгандан сўнг 4 соат ичида тикланади. Препаратни узок қабул қилганда тишларнинг ва орка тилининг юзасини ранги ўзгаришига олиб келиши мумкин, бу ҳолат даволаниши тўхтатишдан сўнг тикланади.

Таблетка лактоза сақлаганини сабабли галактозем, глюкозанинг ёки галактоземини сўрилиши бўзилишида ёки лактоза етишмовчилигида (кам учрайдиган моддалар алмасувининг бузилиши) қабул қилиш мумкин эмас.

Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида қўлланиши

Агар Сиз Дисепт®ни қабул қилаётган вақтда ҳамилдор эканлигингизни билиб қолсангиз, бу ҳақда зудлик билан Ўз шифокорингизга хабар беринг, фақат у даволаниш давом эттиришни хаз қилмади.

Дисепт® дори воситасини ҳомилдорлик даврида қабул қилиш урганлимаган. Шунинг учун ҳомилдорлик даврида дори воситасини қатъий қабул қилиб бўлмайд деб бўлмайд. Қабул қилиш мумкин қачонки она учун дори воситасидан қутилаётган фойда болага потенциал рискдан ортироқ бўлса.

Хлоргексидини она сuti таркибига утиши кузатилмаган. Аскорбин кислотасини она сuti таркибига утиш хуусуняти кузатилган. Қабул қилиш мумкин қачонки она учун дори воситасидан қутилаётган фойда болага потенциал рискдан ортироқ бўлса.

Болаларда қўлланилиши

Ушбу дори шаклини 3 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

Препаратни транспортир восталарни ва потенциал хавфли механизмларни бошқаришга таъсири

Таъсир кўрсатмайди.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Агар Сиз бошқа дори восталарини қабул қилаётган бўлсангиз ёки бироз олдин қабул қилган бўлсангиз, улар рецеттсиз бериладиган бўлса ҳам, илтимос, ўзингизни шифокорингизга ёки фармацевтингизга хабар беринг.

Органик моддаларнинг (плазма, фосфолипидлар) самарадорлигини қамайтиради. Йод препаратлари билан бирга қўллаш тавсия этилмайди. Хлоргексидинни қатгон гуруҳ сасловчи препаратлар (бензалкония хлорид, цетримон бромид) билан қўллаш мумкин.

Дозани ошириб юборилиши

Сизга буюрилган дозадан юқорироқ доза қабул қилинганида дарҳол шифокорга мурожаат қилинг!

Препарат амалда ошқозон ичак трактида сўрилмайди, шунинг учун дозани ошириб юборилиши жуда эҳтимолдан узок. Юқори дозада кўп юборилиши касалхонага етказилиши ва симптоматик даволаниш талаб қилинади.

Чикарлиш шакли

Шимши учун таблеткалар.

10 таблеткадан ПВХ/алюмин фольгали контур уярама.

1, 2, 3, 4 контур уяли ўрам қўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга картон кутига жойланган.

Сақлаш шароити

Куруқ, ёруғликдан химояланган ва болалар ололмайдиган жойда, 25°С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақланин.

Яроқлилик муддати

3 йил. Яроқлилик муддати тугагандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецеттсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

Дори воситасини сифати бўйича эътирозлар (тақлифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва мазлили

«NIKAPHARM» МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Сайрам 7 тор кўчаси 48-А уй.

Тел: +(99871) 1508668; Факс: +(99871) 1508448.

www.nikapfarm.uz

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ДИСЕПТ® DISEPT

Просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию до того, как Вы начнете принимать лекарство. Она содержит важную для Вас информацию.

Сохраните этот листок-вкладыш с информацией по применению, так как позднее Вам может потребоваться прочитать его еще раз.

Для получения любой дополнительной информации или совета, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

Ваш врач выисал данный лекарственный препарат Вам лично. Вы не должны передавать его другим лицам. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с Вашими.

Торговое название препарата: ДИСЕПТ®

Действующие вещества (МНН): хлоргексидин, аскорбиновая кислота.

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания.

Состав:

активные вещества: хлоргексидин гидрохлорид - 5 мг, аскорбиновая кислота – 50 мг;

вспомогательные вещества: сорбитол, лактоза, лимонная кислота, сукралоза, тальк, кремний диоксид коллоидный, ментол, ароматизатор апельсин, магний стеарат.

Описание: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, допускаются вкрапления, со слабым ароматом свойственному используемому ароматизатору.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: A01AB03

Фармакологические свойства

Противомикробное средство широкого спектра действия. Хлоргексидин, разрушая клеточные мембраны бактерий, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (неактивен в отношении кислотоустойчивых палочек Pseudomonas, спор и вирусов). Эффективно удаляет зубные отложения.

Наличие аскорбиновой кислоты (витамина С) повышает местный иммунитет тканей к действию таких факторов, как зубной камень, предохраняет от пародонтитов, участвует в процессе образования коллагена и межклеточного вещества.

Фармакокинетика

Хлоргексидин может попадать внутрь вместе со слюной, однако его всасывание из желудочно-кишечного тракта незначительное. Около 1% хлоргексидина абсорбируется из пищеварительного тракта. Максимальная концентрация в крови достигается приблизительно через 30 минут после применения и составляет 0,206 мкг/л.

Хлоргексидин лишь в минимальной степени подвергается метаболизму в печени и экскретируется желчью в просвет кишечника.

Обычно около 90% проглоченного хлоргексидина выводится с калом в неизменном виде, через кишечник, 1% – почками.

Аскорбиновая кислота хорошо абсорбируется из пищеварительного тракта. Степень ее связывания с белками плазмы составляет приблизительно 25%. Аскорбиновая кислота метаболизируется до дигидроаскорбиновой и шавелевой кислот. Аскорбиновая кислота выводится, главным образом, с мочой.

Показания к применению

Дисепт® применяется в следующих случаях:

- инфекции полости рта, горла, гортани;
- воспалительные заболевания десен;
- пародонтит после хирургического вмешательства;
- пародонтит;
- пародонтоз;
- атрофический стоматит.

Информация о правильном применении

Способ применения и дозы

Всегда применяйте Дисепт® точно в соответствии с рекомендацией Вашего лечащего врача. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Внутрь, по 1 таблетке 4–5 раз в сутки, после еды и чистки зубов, держать во рту до полного рассасывания. Таблетку следует рассасывать медленно. В течение 2 часов после приема препарата следует избегать полоскания полости рта и потребления большого количества жидкостей. Средняя продолжительность курса лечения 5–7 дней. При необходимости назначают 3 таблетки в сутки, в течение 14 дней.

Побочные действия

Как и любой лекарственный препарат, Дисепт® может вызвать побочные реакции, хотя они проявляются не у каждого.

В отдельных случаях возможны следующие побочные реакции: тошнота, боли в эпигастрии, аллергические реакции (кожная сыпь), нарушение вкуса, пародит, болезненность языка и слизистых оболочек, изменение цвета пломб и зубных протезов.

Если у Вас отмечаются любые другие побочные реакции, не описанные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите Вашему врачу, фармацевту или производителю.

Информация, необходимая до начала применения лекарственного средства

Противопоказания

Не применяйте Дисепт® в следующих случаях:

- повышенная чувствительность к хлоргексидину или к любому из вспомогательных веществ;
- непереносимость лактозы;
- детский возраст до 3-х лет (из-за лекарственной формы).

Особые указания

Таблетки рекомендуется применять после еды. Может возникнуть искажение вкусовых ощущений, хотя этот эффект обычно обратим в течение 4 часов после применения препарата.

Длительное применение Дисепта® может приводить к обесцвечиванию зубов и дорсальной поверхности языка, эти явления обратимы после прекращения лечения.

В связи с присутствием в таблетках лактозы данный препарат противопоказан при галактоземии, нарушении всасывания глюкозы или галактозы или при дефиците лактазы (редкие нарушения обмена веществ).

Беременность и период лактации

Если Вы обнаружили, что беременны во время применения Дисепт®, немедленно сообщите об этом Вашему врачу, так как только он может решить вопрос о необходимости продолжения лечения.

Безопасность применения препарата Дисепт® в период беременности не установлена. Поэтому период беременности не является абсолютным противопоказанием для применения препарата. Применение возможно в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и по назначению врача.

Проникновение хлоргексидина в грудное молоко не установлено. Аскорбиновая кислота экскретируется в грудное молоко. Применение возможно в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребёнка.

Применение в педиатрии

Противопоказан в детском возрасте до 3-х лет из-за лекарственной формы (риск аспирации).

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Не влияет.

Лекарственные взаимодействия

Показываясь, сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, даже если они отпускаются без рецепта.

Органические вещества (плазма, фосфолипиды) снижают эффективность. Не рекомендуется совместное использование с препаратами йода.

Возможно применение хлоргексидина с препаратами содержащими катионную группу (бензалкония хлорид, цетримиона бромид).

Передозировка

При приеме более высокой дозы, чем Вам назначено, немедленно обратитесь за помощью к врачу!

Препарат фактически не всасывается из желудочно-кишечного тракта, поэтому передозировка крайне маловероятна. Тяжелая передозировка требует госпитализации и симптоматического лечения.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания.

По 10 таблеток в контурно-ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 4 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

Название и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства

ООО «NIKA PHARM», Республика Узбекистан,

г. Ташкент, 7 проезд ул. Сайрам, дом 48-А.

Тел: +(99871)1508668; Факс: +(99871)1508448.

www.nikapharm.uz